










Ma Boite à QCM

Tableau faune emblématique montagne

Tableau 1																						
Espèce	Hérisson d'Europe	Loup	Renard Roux	Ours Brun	Hermine	Lynx Boréal	Marmotte	Ecureuil Roux (commun)	Lièvre	Bouquetin des Alpes	Mouflon de Corse/ Méditerranéen	Chamois/Isard	Corf élaphe / rouge / d'Europe	Chevreur (cabrol)	Sanglier	Aigle Royal	Gypaète Barbu	Vautour Fauve	Milan royal	Faucon	Hibou Grand Duc d'Europe	
Ordre	Erinacéomorphes	Carnivore caniforme	Carnivore caniforme	Carnivore caniforme	Carnivore caniforme	Carnivore félinforme	Rongeurs	Rongeurs	Lagomorphes	Artiodactyle (ruminant)	Artiodactyle (ruminant)	Artiodactyle (ruminant)	Artiodactyle (ruminant)	Artiodactyle (ruminant)	Artiodactyle (non ruminant)	Accipitriformes	Accipitriformes	Accipitriformes	Accipitriformes	Falconiformes	Strigiformes	
Famille	Erinacéidés	Canidés	Canidés	Ursidés	Mustélidés	Félidés	Sciuridés	Sciuridés	Léporidés	Bovidés (caprinés «sous-famille)	Bovidés (caprinés «sous-famille)	Bovidés (caprinés «sous-famille)	Cervidés	Cervidés	Suidés (suidés)	Accipitridés	Accipitridés	Accipitridés	Accipitridés	Falconidés	Strigidés	
Genre	Erinaceos	Canis	Vulpes	Ursus	Mustela	Lynx	Marmotta	Sciurus	Lepus	Caprins	Ovins	Rupicapra	Cervus	Capreolus	Sus	Aquila	Gypaetus	Gyps Fulvus	Milvus Milvus	Falco	Bubo	
Mâle/Femelle		Louve	Renarde	Ourse					Hase	Bouc / étagne		Bouc / chèvre	Cerf / biche	Brocard / chevrette	Sanglier / laie							
Petit		Louvetéau	Renardeau	Oursou			Marmotton		Levreau	Cabri - Entre 1 et 2 ans : éterlou / éterle	Agneau	Cheveau/cabril Jeunes : Eterlou/éterle (de 1 à 2 ans) Mâle : - Faon - Hère : 8 mois à 1 ans - Daquet : 1 à 2 ans Femelle : - Faon - Béchete : 1 à 2 ans	Faon	Marassin		Aiglon	gypaeton					
Rut	Printemps jusqu'à septembre	Février - Mars	Janvier - Février	Mai - Juin	Mai - Juin	Hiver	Avril - mai, dès sortie d'hibernation	Hiver et printemps	Janvier - novembre	Décembre - mi-janvier	Octobre - novembre	Novembre - Décembre	Septembre - Octobre	Juillet - Août	Octobre - Janvier	Mars - Avril	Décembre - Février	fin décembre	fin mars-début avril	d'avril à juillet	Mars - Avril	
Gestation	5-6 semaines	68 jours	52 jours	8 mois	implantation différée + 20-28 jours = 9-10 mois	63-68 jours	35 jours	38-42 jours	43 jours	170 jours	5 mois	180 jours	8 mois (236 jours)	130 jours (différé de 170 jours)	110 jours	40 jours	55 jours	48 à 55 jours	38 jours		35 jours	
Mise bas	Possibilité de 2 jours	Avril-Mai	Mars-Mai	Janvier-Février	Avril de l'année N-1	Fin printemps	Juin	1-2 portées/an	2-3 portées/an	Mi-juin	Avril	Printemps	Mai	Mai - Juin	Janvier - Avril	Mai - Juin	Février - Mai	courant janvier, écloson mars-début avril				
Portée	4 - 7	3 - 5	4-6	1-3	4-9	1-4	2-6	1-7	2-4	1-2	1-2	1-2	1	2	3-10	1-4	1-2 (le 1er petit tue l'autre)	1 oeuf unique	2-3 oeufs	2 à 6 oeufs déposés à même le sol / 1 fois/an	2-4	
Poids	Été : 800g Hiver : 1,6kg	Mâle : 20-70kg Femelle : 16-50kg	7-8kg	Mâle : 150-200kg Femelle : 70-130kg	Femelles : 110-280g Mâles : 200-450g	10-35kg	2-8kg	300-400g	3-5 kg	Mâles : 65-120kg Femelles : 40-60kg	Mâles : 35-50kg Femelle : 25-35kg	Chamois : Mâle : 35-50kg Femelle : 25-38kg Isard : Mâle : 25-40kg Femelle : 20-32kg	Mâle : 120 - 230kg Femelle : 90 - 130kg	20-25kg	Mâle : 150kg Femelle : 120kg	Mâle : 3-4,5kg Femelle : 4-6,5kg	5-7kg	8-11kg	800g à 1,6kg	150g - 320g	Mâle : 2,5kg Femelle : 3kg	
Taille	H 12-15cm ; L 20-30cm	H 70cm L 160cm	H 35-40cm L 60-90cm	H 150-350cm	F 17-27 cm M 18-32 cm	H 70cm L 75-135cm	H 50-65cm	20-25cm Queue 15-20cm	Jusqu'à 60cm de long	Mâle H 75-90cm Mâle L 140-160cm	Hauteur : 70cm Longueur : 0,9-1,3m	Chamois : Hauteur : 70-80cm Longueur : 1,10-1,40cm	Hauteur : 1,10 - 1,50cm Longueur : 1,60 - 2,60cm	Hauteur : 60-80cm Longueur : 1-1,25m	Hauteur : 80-90cm Longueur : 1,10-1,50m	Envergure : 1,80-2,30m Longueur : 80-95cm	Envergure : 2,50-2,80m Longueur : 1,10-1,50m	Envergure : 240-280cm Longueur : 110cm Mâle plus petit que la femelle	Envergure : 145-170cm Longueur : 66cm	Envergure : 65-82cm Longueur : 40cm	Envergure : 1,50-1,90m Longueur : 75cm	
Durée de vie	3 ans (Bans en captivité)	10 ans (16ans)	2-Sans (14-15ans)	30 ans (40ans)	5-7 ans	15 ans	15 ans	4-7 ans	8 ans	15-20 ans	10-15 ans	25 ans	15 ans	15 ans	20 ans Seulement 7-8 ans du fait de la chasse	20-35 ans	40 ans		26 ans	16 ans	> 20 ans	
Caractéristiques		Gris, masque facial blanc, avant des pattes plus foncé	Roux, gorge plus claire, membre courts, queue fourueuse	Bosse au-dessus des épaules Peut courir jusqu'à 56km/h	Corps longiligne, pattes courtes En été : brun foncé sur le dessus et jaunâtre sur le dessous. En hiver : entièrement blanc à l'exception de l'extrémité de la queue qui reste noire. (homochromie)	Queue 10-25cm. Oreilles triangulaires, touffe de poils au-dessus. Gris, brun : en fonction de son habitat : fourrure recouverte de taches noires ; fourrure dense ; coulier de poils autour du cou	Pelage brun-noir, oreilles rondes, membres courts. Est caecotrophe (redigère ses excréments)	Silhouette fine et élancée, petite tête, grandes oreilles, grands yeux, vibrisses autour du museau, pattes courtes prolongées par de longues griffes acérées, longue queue en panache (qui lui sert de balancier lors des sauts) Un des rares mammifères à distinguer les couleurs	Oreilles plus longues que la tête, pâtes arrières plus larges, pelage fauve / blanc dessous	Femelle gris/brun l'été, plus foncée l'hiver, ventre clair Tâche claire à la croupe Bois perdus à la fin de l'hiver qui repoussent l'été	Mâles bruns, plus clairs en été, tâche blanc sur les flancs Mâles : Cornes 90cm	Chamois : Hauteur : 70-80cm Longueur : 1,10-1,40cm	Été : Beige clair, raie dorsale noire Hiver : Pelage gris - brun Tâche claire à la croupe Bois perdus à la fin de l'hiver qui repoussent l'été	Été : Pelage roux, mâle plus sombre Hiver : Pelage gris - brun Tâche claire à la croupe Bois perdus à la fin de l'hiver qui repoussent l'été	Été : Pelage fauve Hiver : Gris, tâche claire au cou et à la croupe (le miroir) Bois de 20cm pour le mâle qu'il perdent tous les ans en automne	Évolue avec l'âge Maroon > Brun > Noir (> Blanc) Marassins, rayures plus claires	La queue est aussi longue que la largeur des ailes. Fortes digitations au bout des ailes.	Alles étroites et élancées Queue en losange Alles grises Tête et ventre oranges Cercle rouge autour de l'oeil Plumes aux pattes Vibrisses (barbe) noires	Incapable de pratiquer le vol battu pdt de longs moments, il profite des courants ascendants crâne recouvert de duvet blanc, coloré de plumes blanches, bec couleur corne, yeux jaunes, ventre fauve, dos chamois-brun, queue courte	plumage foncé avec 2 « fenêtres » blanches sous les ailes. Queue en « M »	vol en « Saint Esprit » (stationnaire) Couleur dépend des espèces	Yeux oranges Aigrettes noires Pattes emplumées
Alimentation	Omnivore tendances carnivore, insectivore (insectes, vers, limacors, oeufs, fruits, baies, serpents, lézards, rongeurs, oiseaux, batraciens)	Carnivore 2-4kg de viande/jour (rongeurs, cervidés, bovidés, sangliers)	Omnivore tendances carnivore, insectivore (insectes, lapins, oiseaux, oeufs, fruits, baies, rongeurs, poissons)	Omnivore 80% végétaux, 20% viande (ovins, cervidés, mammifères)	Carnivore strict-petits mammifères (rongeurs, lapins, écureuils, mulots), oiseaux, reptiles, grenouilles, chauves-souris, poissons, insectes	Carnivore, petits mammifères (rats, souris, écureuils), petits cervidés, bovidés (chamois), lapins, lièvres, oiseaux, reptars.	Omnivores, graminées, végétaux, fruits, vers, larves, oeufs, insectes. Ne bot pas	Prédominance herbivore : Graines de confères, noisettes, châtaignes, noix, écorces, bourgeons, fleurs, fruits et champignons selon la saison. Occasionnellement, le rongeur mange des insectes, des escargots ou des oeufs d'oiseaux	Herbivore : Graminées, poissettes, truffes	Herbivore : Graminées, feuilles, jeunes pousses, jusqu'à 20kg/jour	Herbivore : Graminées, bourgeons, frites, champignons, mousse (racines, écorces)	Herbivore : herbes, sapin, bourgeons, pousses d'arbres, graminées, lierre, ronce, maïs, colza	Herbivore : herbes, sapin, bourgeons, pousses d'arbres, graminées, lierre, ronce, colza	Herbivore : herbe, semi-ligneux (ronce, lierre), myrtilles, framboises, résineux, sapin, pin, céréales en plaine.	Omnivore 95% végétal (fruits, graines, racines) 5% insectes, larves, vers, reptiles, batraciens	Carnivore : marmottes, petits ongulés, petits lièvres, renard, campagnol	Carnivore Chacogrand Nérophage (ongulés exclusivement) Os jusqu'à 80%	chacogrand nérophagie strict, préfère la viande fraîche, non putréfiée	nérophagie, mais aussi prédateur, vers, petits mammifères, lézards, amphibiens, gros insectes	prédateur de petits mammifères, lézards, poissons, amphibiens, gros insectes	Carnivore, mange tout ce qui bouge : mammifères, oiseaux, poissons, amphibiens, reptiles, insectes	
Adaptation hiver	Hibernation	Fourrure plus fournie	Fourrure plus fournie, réserve de nourriture, peut devenir chacogrand	Léthargie de mi-nov à mi-mars, (hivernation)	change de couleur de robe, hiver : entièrement blanc à l'exception de l'extrémité de la queue qui reste noire (dimorphisme saisonnier)	attaque + de grosses proies	hibernation octobre-avril	n'hierne pas, constitue des résene de nourriture qu'il cache pour l'hiver	En hiver, rameaux, écorces, herbes séchées. Lièvre variable change de couleur l'hiver, devient blanc, bout des oreilles noir	Peuvent descendre dans les forêts si froid et neige. Soleil et immobilité en automne	Peut descendre en forêt l'hiver	Peuvent descendre à la limite de la neige Mange des feuilles séchées, des aiguilles de pin, grattent la neige	Écorce, ligneux	Ligneux	Peut manger des charognes	Nids dans des parois difficiles d'accès Haute montagne (à où il y a des ongulés sauvages) Limite forêt Sédentaire	migrateur					
Mues		mue continue	mue continue		Mi-mars/automne				blanc l'hiver pour le L. variate	Pelage plus sombre l'hiver	Pelage plus clair l'été pour les mâles											
Sens	Vue basse, ouïe fine	Vue ordinaire, ouïe et odorat ++	Vue surtout sensible aux mvts,ne voit pas le orange, ouïe et odorat ++	Vue basse, odorat et ouïe fine	Vue, ouïe et odorat ++	Vue et odorat ++	Vue basse, mais ouïe et odorat développés					Bonne vue (sensible aux mouvements)				Vue 8 fois supérieure à l'homme	Excellente vue					
Social	Rayon de 4km	meutes 3 à 8 individus	Plutôt solitaire, parfois en couple ou groupe, très territorial	Polygamie, solitaire	Nocturne, territoriale, solitaire. Territoires distincts pour M et F	prédateur solitaire, territoire marqué (200xm2), nocturne, très discret	vie en colonies (plusieurs familles)	solitaire, diurne	solitaire	hardes de mâles et femelles	Hardes de mâles, femelles et petits	Hardes de femelles et petits Mâles solitaires à l'automne	Hardes de mâles Hardes de femelles Femelle reste avec sa mère toute sa vie (philopatrie)	Cellule familiale autour de la mère, puis les jeunes se dispersent.	Hardes dirigées par les femelles Mâles solitaires	Monogamme		vit en colonie, il la quitte à l'automne, et revient en fin d'après-midi. S'accouple pour la vie. Adultes sédentaires, les juvéniles migrent vers l'Afrique	Solitaire en dehors période de nidification			
Cadre de vie	Terrier ou tronc, le même l'hiver	Tanière, forêt	Terrier d'un autre animal	Tanière, hiver dans caverne ou crevasse	forêts boisées, prairies, zones agricoles, en montagne,	Tanière, forêts, sous-bois denses	Terrier, terrain meuble, encaissé, herbeux, dégagé	forêts de confères (pins épicéas), les forêts de feuillus et les forêts mixtes. Le rongeur peut évoluer en montagne jusqu'à 2 000 m d'altitude. Il fréquente également les zones urbaines qui proposent des jardins et des parcs arborés.	niche dans les herbes hautes, pas de terrier. Nocturne, repos la journée	durme, falaises, éboulis, sommets rocheux, vives au soleil	Durme (aube, crépuscule) Cherche la fraîcheur en été (3000m) N'aime pas la neige	Utilisent le relief pour fuir Zone de forêt et hors zone pastorale (800-2300m) (restent là où il y a de l'herbe) Incursions en haute altitude Peuvent descendre bas	Forêt (+dense pour repos diurne) Prairies pour alimentation nocturne Sédentaires	Milieu forestier ou agricole	Nocturne Dort dans des bauges le jour	Nids sur parois verticales inaccessibles (parfois sur les arbres) avec vue dégagée Sédentaires Chasses : Entre forêt et territoires très grands. 3000m	paysages ouverts avec falaises avec grand dénivelé. Aime la chaleur et les coins ensoleillés	espaces très ouverts, prairies, cultures, champs. Habitat forestier feuillus ou confères	Très adaptable, espaces ouverts, site de nidification arboricole ou rupestre	Falaises proches de plans d'eau Nids de corvidés Nocturne		
Massifs	Tous	Tous (un peu), surtout Alpes	Tous	Pyénées (réintroduit 1986)	Tous	Vosges, Alpes, Jura	Pyénées (Réintroduites 1949), Massif Central (R1984), Alpes (R 74, 84)	Tous	Tous	Alpes (réintroduits à partir de l'Italie), Pyénées (bouquetin ibérique réintroduit)	Corse, Alpes, Pyénées, Massif Central	Chamois : Alpes, Jura et introduit dans le Vosges et le Massif Central Isard : Pyénées	Alpes, Massif Central, Jura, Vosges, Pyénées	Tous	Tous	Alpes, Jura, Corse, Massif Central, Pyénées	Pyénées, Alpes (réintroduction), Corse Programme de réintroduction dans le Vercors et les Causses		Pyénées, Massif Central, Alpes, Jura, Vosges (pas en Corse)			
Pays	Toute Europe hors grand Nord	France, Espagne, Italie	Tout hémisphère Nord	Espagne (Pyénées), Italie, Slovénie, Autriche (arc alpin)	Europe	Espagne, Suisse, Italie,...	Pyénées, Arc alpin	Europe	Europe	France, Italie	Europe (réintroduits)	Europe et +	Europe et +	Europe	Partout		Europe du Sud		Toute Europe	Toute Europe	Europe de l'Ouest	
Statut	Protégé en France https://www.legifrance.gouv.fr/tda/id/JORFTEXT000000649682	Protégé en France https://www.legifrance.gouv.fr/tda/id/JORFTEXT000000649682	Chassable https://www.legifrance.gouv.fr/tda/id/JORFTEXT000000296288	Protégé en France https://www.legifrance.gouv.fr/tda/id/JORFTEXT000000649682	Chassable https://www.legifrance.gouv.fr/tda/id/JORFTEXT000000296288	Protégé en France https://www.legifrance.gouv.fr/tda/id/JORFTEXT000000296288	Chassable https://www.legifrance.gouv.fr/tda/id/JORFTEXT000000296288	Protégé en France https://www.legifrance.gouv.fr/tda/id/JORFTEXT000000649682	Chassable https://www.legifrance.gouv.fr/tda/id/JORFTEXT000000296288	Protégé en France tout comme le bouquetin ibérique	Mouflon méditerranéen Chassable : Mouflon de corse protégé en France https://www.legifrance.gouv.fr/tda/id/JORFTEXT000000296288	Chassable https://www.legifrance.gouv.fr/tda/id/JORFTEXT000000296288	Chassable https://www.legifrance.gouv.fr/tda/id/JORFTEXT000000296288	Chassable https://www.legifrance.gouv.fr/tda/id/JORFTEXT000000296288	Chassable https://www.legifrance.gouv.fr/tda/id/JORFTEXT000000296288	Protégé en France (Royal, de Bonelli, Bonie, Pomarn, Chard, Pygargue) https://www.legifrance.gouv.fr/tda/id/JORFTEXT000000296288	Protégé en France (Royal, de Bonelli, Bonie, Pomarn, Chard, Pygargue) https://www.legifrance.gouv.fr/tda/id/JORFTEXT000000296288	Protégé en France (perspective et moine aussi) https://www.legifrance.gouv.fr/tda/id/JORFTEXT000000296288	Protégé en France (Royal et non) https://www.legifrance.gouv.fr/tda/id/JORFTEXT000000296288	Protégé en France (crocotte, émirillon, nobereau, pelerin) https://www.legifrance.gouv.fr/tda/id/JORFTEXT000000296288	Protégé en France (Royal et non) https://www.legifrance.gouv.fr/tda/id/JORFTEXT000000296288	
Prédateur	Renard, chien, blaireau		Loup, lynx, aigle, hibou Grand Duc		Renard, blaireau, martre, rapaces	Ours, loup	Aigle royal	Le renard, la martre des pins, l'autour des palmiers, la buse variable, la pie, certains rapaces nocturnes, le chien et le chat domestique sont ses principaux prédateurs.	Homme, renard, aigle, rapaces, mustélidés	Homme, loup, aigle (cabris)	Homme, loup	Loup, aigle, lynx, (renard)	Homme, loup	Homme, lynx, loup, chien errant, renard	Homme, loup							
Effectifs																400 couples en France 8500 en Europe	54 couples en France.			1500 couples en France Entre 20 et 40000 couples en Europe		
Mode déplacement	Plantigrade	Digitigrade	Digitigrade	Plantigrade à l'arrière, digitigrade à l'avant	Digitigrade	Digitigrade	Plantigrade	Plantigrade	Plantigrade	Ongulé, 2 doigts	Ongulé, 2 doigts	Ongulé, 2 doigts	Ongulé, 2 doigts + 2 autres en arrière sur terrain mou	Ongulé, 2 doigts + 2 autres en arrière sur terrain mou	Ongulé, 4 doigts							
Traces	 Patte antérieure à gauche Patte postérieure à droite L : 2,5cm l : 2,8cm	 Patte antérieure L : 9-11cm l : 8-10cm Patte postérieure L : 8cm l : 7cm	 Patte antérieure et postérieure. L : 5-7cm l : 4-4,5cm	 Patte antérieure à gauche L : 18cm l : 21cm Patte postérieure à droite L : 27cm l : 17cm	 Patte antérieure (non représentée) L : 2cm l : 1,5cm Patte postérieure L : 3,5cm l : 1,3cm	 Patte antérieure L : 6,5cm l : 5,5cm Patte postérieure L : 7,5cm l : 6cm	 Patte antérieure à gauche L : 3,5cm l : 2,5-3,5cm	 Patte antérieure à gauche L : 6,5cm l : 5,5cm Patte postérieure à droite L : 7,5cm l : 6,5cm	 L : 7cm	 Pattes antérieure et postérieure L : 5cm l : 4cm	 Pattes antérieure et postérieure L : 5cm l : 4cm	 Pattes antérieure et postérieure L : 6,5cm l : 4,5cm	 Pattes mâles à gauche L : 2-3cm	 L : 2-3cm	 L : 10cm gardes (doigts supérieurs) bien visibles, distance entre les gardes x 10-poids de l'animal							

Ma Boite à QCM

Tableau faune emblématique montagne

Espèce	Chouette hulotte	Chouette de Tengmalm	Chevechette	Grand Tétrás (différent du Tétrás Lyre)	Pendrix Bartavelle	Pendrix Grise des Pyrénées	Lagopède	Chocard à bec jaune
Ordre	Strigiformes	Strigiforme	Strigiforme	Galliforme	Galliforme	Galliforme	Galliforme	Passeriforme
Famille	Strigidés	Strigidés	Strigidés	Phasianidae	Phasianidae	Phasianidae	Phasianidae	Corvidés
Genre	Strix	Aegolus Kaup	Glaucidium	Tetrao Urogallus	Alectoris	Pendrix Brisson	Lagopus	Pyrrhocorax
Mâle/Femelle				Coq / Poule		Coq / poule		
Petit		Poussin		poussins				
Rut	Février - Avril	Cycle de reproduction entre août et novembre.		juin - Juillet			Mai - Juin	
Gestation	30 jours	25 à 32 jours sous couvée	28 à 30 jours sous couvée	éclosion après 4 semaines	25 jours		25 jours	20 jours
Mise bas		Fin février à début mai : ponte	Début avril à début mai : ponte	juin - Juillet		Fin mai - juin (ponte)		
Portée	3-5	3-10 oeufs	5-7 oeufs	6-9	8-14	14-15 oeufs pour en moy. 3 jeunes	8-12	3-5
Poids	500g	Mâle : 90-113g Femelle : 126-194g	Mâle : 50g Femelle : 80g	Mâle : 4kg Femelle : 2kg	600g	Mâle : 315-385g Femelle : 300-365g		200g
Taille	Envergure : 1m Longueur : 40cm	Envergure : 55-62cm Longueur : 25-27cm	Envergure : 35cm Longueur : - Mâle : 16-17cm - Femelle : 18-19cm	Envergure : 87 - 125cm Longueur : 115cm	Longueur : 40cm	Envergure : Longueur :	Longueur : 35cm	Envergure : 80cm Longueur : 36-39cm
Durée de vie	18 ans		7 ans	10 ans				16 ans
Caractéristiques	Yeux foncés Corps roux ou gris Pas d'airette	Manteau brun - chocolat avec le dessus de la tête pointillé de blanc. V blanc entre les yeux. Dos et épaules bariés de tâches blanches. Dessous blanchâtres taché de brun. Tête ronde avec disques faciaux très prononcés. Pattes emplumées jusqu'aux doigts. Les iris jaunes cerclés de noir lui donne un air étonné caractéristique. Le plumage du juvénile est entièrement brun - chocolat.	Plumage brun-gris ponctué de blanc, poitrine blanchâtre avec de fines rayures verticales. Sourcils blancs. Signale sa présence sur son territoire à l'aide et au cri assourdi par son chant et divers cris. Chant monotone, série de sons affilés « du » répétés toutes les demi-secondes.	Coq : Noir, canoques (excroissances charnues) sur sourcils rouges, barbe, bec blanc. Poule : Rousse tacheté de noir	Gorge blanche Collier noir	Dimorphisme sexuel peu marqué. Tâches claires en forme de losange sur les plumes du haut du dos et du cou. Présence assez régulière de tâches noires sur la partie rousse des rectrices (grandes plumes de la queue). Les petits quittent le nid après 2 mois.	Été : Brun Hiver : Blanc Pattes couvertes de plumes	Noir Bec jaune
Alimentation	Carnivores : Petits mammifères, chauve-souris, insectes	Petits mammifères : campagnols, souris mursaignes et petits oiseaux.	Petits mammifères : mulots et campagnols. Petits passereaux : mésanges, rouges gorges, roitelets, troglodytes. Surtout chasse à l'affût mais aussi parfois dans les nids des pics pour les mésanges et autres qui s'y trouvent.	Herbivore : Baies, pousses, aiguilles de conifères	Granivore : Graines Petits invertébrés	Pousses de végétaux. Printemps et automne : insectes, graines et baies en plus.	Bourgeons, baies, insectes, larves, végétaux	Omnivore : insectes, invertébrés, baies, graines, restes de casse-croûte
Adaptation hiver	Peut migrer			Limite ses déplacements		Suivant l'enneigement, même habitat qu'en période de reproduction, soit pelouses rares d'altitude déneigées régulièrement par le vent, soit zones de culture de basse altitude (céréales, prairies de fauche).		
Mues								
Sens	Vue un peu > à l'homme Très bonne ouïe		Très bonne ouïe pour la chasse de nuit. Mauvaise vue dans l'obscurité complète.					
Social		Les jeunes prennent leur envol après 4-5 semaines. Ensuite, dispersion sur 10 à 20 km, parfois plus de 1000km. Relativement sociale, ne reste pas en couple hors période de reproduction. Dans certains cas (abondance alimentaire notamment), la femelle peut entreprendre une seconde nichée avec le même mâle (bigynie), le mâle peut aussi entreprendre avec une seconde femelle (blandrie).	Les petits quittent le nid après 28 à 32 jours. Avant d'être indépendants sur la nourriture, les parents subviennent à leurs besoins pendant 2 à 4 semaines.			Monogame. Active en début et fin de journée, seul en hiver, tout au long de la journée.	Monogame	
Cadre de vie	Nocturne Nid : Trou déjà fait dans un arbre ou un roc	Forêts de feuillus et de conifères, surtout en montagne. Sédentaire, elle peut se disperser si la nourriture vient à manquer.	Au-dessus de 1000m, dans des cavités de pics pour stocker sa nourriture et se reproduire. Sédentaire.	limite supérieure de la forêt, landes claires - places de chant - pour la parade d'accouplement	Pentes rocheuses entre 1000 et 2000m (= bas l'hiver)	Nid sur le sol Landes et pelouses situées aux expositions chaudes, comprises entre 1300 et 2500m. Sédentaire, mouvements de faible ampleur selon les saisons et les conditions météorologiques.	Nid sur le sol Zone rivale près des neiges éternelles : 1800 à 3000m.	Nid dans les falaises, jusqu'à 4000m
Massifs	Tous sauf Corse	Alpes, Jura, Vosges. Plus rare dans le Massif Central et les Pyrénées.	Jura, Alpes, Vosges	Jura, Vosges, Pyrénées, Massif Central (Cévennes) Alpes : Tétraz Lyre des Alpes		Pyrénées	Alpes, Pyrénées	Alpes, Pyrénées, Corse
Pays		Europe Centrale et septentrionale jusqu'à la Sibirie orientale « Amérique du Nord.	Europe Centrale et septentrionale jusqu'à la Sibirie orientale.		Sud Est de l'Europe	France, Espagne		
Statut	Protégé en France https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT0000021384277	Protégé en France https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT0000021384277	Protégé en France https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT0000021384277	Chassable, mais moratoire de 5 ans (2022-2027) https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000000296288	Chassable https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000000296288	Chassable https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000000296288	Chassable https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000000296288	Protégé en France (tout comme autres corvidés de montagne : le casse-noir moucheté, crève à bec rouge, grand corbeau) https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000000296288
Prédateur								
Effectifs		1000 à 3000 couples	Plusieurs centaines de couples.			3000 couples reproducteurs en France		
Mode déplacement								
Traces								
								